



NATIONAL HEMOPHILIA FOUNDATION

for all bleeding disorders

MASAC **PARA USTED**

Directrices Para el Tratamiento De La Hemofilia Y Otros Trastornos Hemorrágicos En Los Servicios De Urgencias



ABOGACIA PROPIA

Nadie conoce su salud y su cuerpo mejor que usted. Estas directrices pueden ayudarle a usted y a su cuidador principal a reclamar lo que necesita cuando visitas a un servicio de urgencias para recibir atención médica.



ADMISIÓN

ALERTAR al personal que tienes un trastorno hemorrágico tan pronto como llegues.

PROPORCIONAR los datos de contacto de su hematólogo o médico de atención primaria y pida que le llamen para hablar con ellos.

ABOGAR para que el personal le dé el medicamento que utiliza para tratar su trastorno hemorrágico tan pronto como ingrese, en lugar de esperar a reunirse con el médico o a que le hagan pruebas como análisis de laboratorio o radiografías.



EVALUACIÓN

COMPARTIR con el servicio de urgencias una copia de las pautas de dosificación del medicamento de su hematólogo. Algunos Centros de Tratamiento de la Hemofilia lo llaman «carta para viajar».

EXPLICAR que las decisiones de tratamiento deben tomarse basadas de la sospecha de un problema relacionado con la hemorragia y no deben esperar por los resultados de los análisis.

DIAGNÓSTICO



ABOGAR para recibir el medicamento que utiliza para tratar su trastorno hemorrágico antes de realizar cualquier prueba para encontrar la causa del problema (radiografías computarizadas, etc.), especialmente en el caso de un traumatismo craneal or una sospecha de hemorragia cerebral.

RECORDAR al proveedor que NO se recomienda la toma de imágenes para la hemorragia articular de rutina.

TRATAR previamente antes de una cirugía o procedimiento invasivo para mantener sus niveles de factor al 100% con el medicamento que utiliza para tratar su trastorno hemorrágico.

RECORDAR al proveedor del servicio de urgencias que las pruebas de rutina no son necesarias para tratar un episodio de hemorragia común, a menos que lo pida su hematólogo.

TRATAMIENTO

Las señales para saber cuándo debe utilizar el medicamento para tratar las hemorragias son:



- Sospecha de hemorragia en una articulación o músculo
- Cualquier lesión grave en la cabeza, el cuello, la boca o los ojos o señal de hemorragia en estas zonas
- Cualquier dolor de cabeza nuevo o inusual, sobre todo después de una lesión
- Dolor intenso o hinchazón en cualquier sitio
- Una herida abierta que necesite puntos de sutura, adhesivos o tiras esterilizadas
- Antecedentes de un accidente o traumatismo que pueda provocar una hemorragia interna
- Cualquier procedimiento invasivo o cirugía
- Sangrado abundante o continuo de cualquier sitio
- Hemorragia estomacal que provoca niveles de hierro moderados o severamente bajos
- Huesos rotos, dislocaciones y torceduras
- Hemorragias menstruales abundantes que provocan niveles de hierro de moderados a severamente bajos o un volumen de sangre bajo...

DIRECTRICES DE REFERENCIA MASAC

Actualmente, estas directrices no están disponibles en español.

MASAC Document 257 - Guidelines for Emergency Department Management of Individuals with Hemophilia and Other Bleeding Disorders

MASAC Document 258 - Recommendation on the Use and Management of Emicizumab-kxwh (Hemlibra[®]) for Hemophilia A with and without Inhibitors

MASAC Document 260 - Management of Chronic Pain in Persons with Bleeding Disorders: Guidance for Practical Application of The Centers for Disease Control's Opioid Prescribing Guidelines

MASAC Document 263 - MASAC Recommendations Concerning Products Licensed for the Treatment of Hemophilia and Other Bleeding Disorders

MASAC Document 264 - MASAC Recommendations Regarding Diagnosis and Management of Inherited Bleeding Disorders in Girls and Women with Personal and Family History of Bleeding

MASAC Document 265 - MASAC Guidelines for Pregnancy and Perinatal Management of Women with Inherited Bleeding Disorders and Carriers of Hemophilia A or B

MASAC Document 266 - MASAC Recommendations Regarding the Treatment of von Willebrand Disease